

Rosanna Lambertucci

Ha intervistato

Il Dott. GIOVANNI SALT

Docente di Medicina Estetica

Dott. Salti, dopo aver subito un' ancoraggio dei denti spesso la pelle sopra il labbro superiore viene segnata da dei piccoli solchi, delle rughette.....Come si possono togliere?

Le rughe perorali, dovute a perdita di supporto osseo (che spesso si vedono anche in chi fuma, o anche solo per il fisiologico processo di invecchiamento) si possono trattare con le tecniche laser (resurfacing ablativo o non ablativo) e con l'ausilio delle iniezioni di un filler (come l'acido ialuronico), iniettato sul bordo del vermiglio (la parte rossa del labbro) e anche direttamente nella ruga nella parte bianca del labbro.

Le labbra sono un punto forte di fascino femminile, ma sono particolarmente sensibili. Sono sempre di più le donne che richiedono l'aumento del volume delle labbra. Oggi lo si può ottenere con tecniche diverse, applicabili a seconda dei singoli casi....

Solitamente l'interventi estetico più comune sulle labbra è l'aumento di volume, bocca piccola e sottile non è sinonimo di bellezza, bocca grande e labbra voluminose spesso sono associate a sensualità. Labbra appariscenti per attirare l'attenzione, piccoli ritocchi per mettere in maggiore rilievo i margini, interventi estetici in forte aumento nel nostro Paese.

Per alcune donne la perdita di volume e di tono è spesso legato all'età, l'effetto svuotamento che si osserva richiede in questi casi un interventi estetico adeguato per ripristinare dei volumi soddisfacenti.

Le tecniche variano in funzione del tipo anatomico di labbro e di cosa vogliamo ottenere. Il metodo di trattamento più comune è l'impianto di un filler, come l'acido ialuronico o il collagene.

Per ottenere una definizione dei contorni il filler viene iniettato lungo il bordo del vermiglio. In questo modo non si altera se non in minimo modo il volume del labbro.

Per ottenere una maggiore proiezione della mucosa l'impianto del filler viene eseguito direttamente a livello del piano sottomucoso, un paio di millimetri dal bordo del vermiglio.

Per ottenere un vero e proprio aumento volumetrico, il filler viene iniettato più profondamente, nella sottomucosa al confine fra la parte umida e quella asciutta del labbro stesso.

E' fortemente sconsigliato l'utilizzo di filler permanenti!!

Sempre più spesso però vediamo in giro delle labbra troppo gonfie... spesso il risultato di interventi estetici sbagliati. Si possono correggere...ossia si possono ridurre?

Anche per le labbra occorre prendere come riferimento dei canoni oggettivi di miglioramento estetico. La chirurgia estetica come tutte le altre discipline scientifiche deve essere capace di risultati ripetibili e oggettivi, applicati e adeguati alle singole caratteristiche dei pazienti e non senso artistico individuale della persona o dell'operatore.

In linea di principio possiamo dire che nella nostra popolazione, morfologicamente parlando, a differenza delle razze africane per esempio, lo spessore delle labbra superiori dovrebbe essere leggermente maggiore rispetto a quello delle inferiori. Chi inconsapevolmente mira, mediante correzioni, ad aumentare le labbra inferiori a scapito delle superiori, probabilmente non si rende conto che sta andando in una direzione opposta, rispetto a quella che consente di armonizzare le labbra con la morfologia del viso, nella nostra razza. Se l'eccesso di volume è stato ottenuto con un prodotto riassorbibile è sufficiente aspettare che il prodotto si riduca

spontaneamente nel tempo. In caso di impianto di materiali permanenti, abbiamo poche possibilità di rimuoverli, se non chirurgicamente. Talvolta l'iniezione di un potente cortisonico può aiutare a ridurre un pò la fibrosi che si forma in seguito alla iniezione di silicone liquido (peraltro proibita dalla legge); ma nel caso di altri materiali permanenti solo la chirurgia può aiutare a ridurre il problema, ma non sempre i risultati siano prevedibili, per cui è buona regola farsi iniettare solo prodotti riassorbibili.